

DESCRIPTION DE RACE

Nez Noir du Valais (NN), race 4

Mouton de montagne de grand format, harmonieux, affichant de bonnes aptitudes maternelles et des performances laitière et carnée élevées, résistant, et présentant des membres solides. Le port de cornes ainsi que les caractéristiques de couleurs font la typicité du mouton Nez Noir du Valais, race sans pareil.

Tête courte, de port fier, avec mufle et front larges, profil du nez busqué; oreilles de longueur moyenne; paré de cornes. Forme de la tête marquée chez le bélier.

Corps entier, tête et pattes comprises, recouvert uniformément de laine; toison uniformément blanche; nez noir jusqu'à mi-hauteur de la face.



Historique de la race: La race Nez Noir du Valais a été mentionnée pour la première fois au 15^e siècle. Ses caractéristiques acquises au fil des siècles, comme la capacité d'adaptation au climat rude des montagnes, l'utilisation du fourrage, la fécondité, la frugalité et la fidélité à l'emplacement en font une race sans pareil.

Cheptel au herd-book: environ 17 % du cheptel total au herd-book

Buts d'élevage:

- résistance, santé, absence de tares héréditaires, bonne faculté d'adaptation
- longévité et forte productivité
- durée moyenne de production: 5 ans
- capacité élevée de consommation et d'assimilation de fourrages grossiers
- maintien de l'excellente aptitude à l'estivage en montagne, robustesse; caractéristiques de couleur correctes tant chez la brebis que chez le bélier

Agnelage: désaisonné, agnelages principalement en automne et en fin d'hiver/printemps. Premier agnelage à 14 mois.

Fécondité:

- Ø 1,6 agneau par brebis et par an
- brebis jusqu'à l'âge de 3 ans: au moins 4 agneaux nés vivants, signe de productivité: *
- brebis 4^e et 5^e année: au moins 4 agneaux nés vivants, signe de productivité: *

Standard / aspect général

1. Type (format)

Caractéristiques de couleur: nez noir jusqu'à la mi-hauteur de la face; pourtour des yeux noir, lié des deux côtés à la couleur du nez; oreilles noires; paturons noirs; taches noires uniformes à la pointe des jarrets et aux genoux; chez la brebis, une tache noire à la naissance de la queue est souhaitée, mais ne peut être trop grande et doit être interrompue; chez le bélier, on ne tolère pas de tache noire à la queue.

Taille et poids minimum des animaux adultes:

Hauteur au garrot:	♂ 75 cm	Poids:	♂ 80 kg
	♀ 72 cm		♀ 70 kg

Tête et encolure: tête courte, port fier, avec mufle et front larges, chanfrein busqué; position des dents superposée ou adjacente; oreilles de longueur moyenne; forme de la tête marquée chez le bélier; encolure courte et bien musclée.

Cornes: en spirale, bien dégagées des joues et horizontales, quelques stries noires tolérées.

Poitrine, garrot, dos: poitrine large, profonde, avec côtes bien rondes, épaules bien attachées, garrot large et fermé. Ligne supérieure droite, dos large; reins larges et bien musclés, flancs de bonne profondeur; bassin de longueur moyenne et large; gigots bien musclés.

2. Membres

Membres: solides et bien posés, pas de jarrets clos, pas de jambes ouvertes, position large des membres antérieures (pas de jambes en X).

Aplombs: jarrets moyennement arqués, paturons courts et forts, ossature solide.

Allure: large, sûre et non vacillante.

3. Laine

Toison uniforme et naturelle sur tout le corps, tête et pattes comprises; toison uniformément blanche et homogène; quelques poils noirs tolérés sur l'encolure chez les femelles et chez les mâles de plus de 18 mois.

Finesse: F 5–4, longueur des mèches à 180 jours plus de 10 cm.

Défauts d'esthétique:

- caractéristiques de la race manquantes (uniquement chez les brebis)
- taches blanches au dessus du jarret (raie)
- absence de nez busqué
- animaux négligés

Motifs d'exclusion (note 1):

1^{re} appréciation ou jusqu'à l'âge de 18 mois:

Défauts génétiques:

- | | |
|----------------|--|
| Type: | <ul style="list-style-type: none">- anomalie testiculaire, hernie génitale- trop petit- mâchoires de longueurs inégales, position des dents |
| Membres: | <ul style="list-style-type: none">- pâtures affaiblis, position de membre extrêmement anormale |
| Laine: | <ul style="list-style-type: none">- poils morts et poils crépus dans la toison ainsi que jarres en quantité trop importante- laine mêlée chez les béliers jusqu'à 18 mois |
| Défaut acquis: | <ul style="list-style-type: none">- poils crépus |

Défauts spécifiques à la race:

- absence d'une tache noire sur le jarret et le genou (uniquement chez les béliers).
- tache sur la partie intérieure de la queue (uniquement chez les béliers)
- taches sur le corps à l'intérieur de la limite de la toison (uniquement chez les béliers)
- coloration noire partant des bourses jusque dans la toison

- | | |
|-------------------|--|
| Ne pas apprécier: | <ul style="list-style-type: none">- animaux sans marque auriculaire- En plus pour les marchés-concours intercantonaux:<ul style="list-style-type: none">- animaux malades ou blessés, souffrant entre autre de:<ul style="list-style-type: none">- piétin- ecthyma contagieux- cécité du chamois- affections ou blessures mammaires- mamelles n'ayant qu'un seul trayon fonctionnel- affections des organes génitaux- animaux fortement amaigris- animaux fortement souillés |
|-------------------|--|